

환자용 사용설명서**루파핀정(루파타딘푸마르산염)****이 약을 복용하시기 전에 본 사용설명서를 상세히 읽어 주시기 바랍니다.**

- 본 설명서를 다시 읽어보아야 할 수 있으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 추가적인 문의사항이 있을 경우 의사 또는 약사에게 문의하여 주십시오.
- 이 약을 처방 받은 환자 이외의 사람이 복용하지 않도록 주의하여 주십시오.
(처방 받은 환자와 증상이 같은 사람일지라도 복용해서는 안됩니다.)
- 부작용이 심해지거나, 본 설명서에 없는 부작용이 발생하였을 경우, 의사 또는 약사에게 알려주시기 바랍니다.

본 설명서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.

1. 이 약은 무엇이며, 어디에 쓰이는 약입니까?
2. 이 약을 복용하기 전 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
3. 이 약은 어떻게 복용해야 합니까?
4. 이 약의 복용 후 발생 가능한 부작용은 무엇입니까?
5. 이 약은 어떻게 보관해야 합니까?
6. 기타 정보

1. 이 약은 무엇이며, 어디에 쓰이는 약입니까?

이 약은 항히스타민제입니다.

이 약은 환자의 재채기, 콧물, 눈 가려움, 코 가려움 등 알레르기성 비염 증상과, 가려움, 발진 등 두드러기 증상을 치료하기 위하여 쓰입니다.

2. 이 약을 복용하기 전 주의해야 할 사항은 무엇입니까?

1) 다음의 경우 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 또는 이 약에 함유된 성분에 대해 과민증이 있을 경우 복용하지 마십시오.
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 복용하지 마십시오.
- 만 12세 미만의 어린이는 복용하지 마십시오.

2) 다음의 경우 이 약을 신중히 복용하십시오.

- 신장 또는 간 질환(장애)가 있는 경우, 이 약을 복용하기 전 의사와 상의하시기 바랍니다. (이 약은 신장 및 간질환 환자 권장되지 않습니다.)
- 만 65세 이상의 환자의 경우, 복용 전 의사와 상의하시기 바랍니다.

3) 함께 복용하는 다른 의약품

- 최근에 복용하였거나 현재 복용중인 의약품 (다른 의사에게 처방 받은 전문의약품 및 약국에서 구매한 일반의약품 포함) 정보를 의사 또는 약사에게 이야기해 주시기 바랍니다.
- 이 약을 복용 중일 때는, 케토코나졸 및 에리스로마이신 성분이 있는 의약품은 복용하지 마십시오.
- 스타틴 계열 약물(예; 고혈압제제), 미다졸람(수면유도제)와 함께 복용하지 않도록 하며, 복용 시 의사 또는 약사와 상의하시기 바랍니다.

4) 주의해야 할 음식

- 이 약은 자몽주스와 함께 복용하지 않도록 합니다. (함께 복용 시, 몸 안의 루파타딘의 농도를 높일 우려가 있습니다.)
- 이 약은 알코올과 함께 복용하지 않도록 합니다.

5) 임신 및 수유기

- 의사의 특별한 의견이 없는 경우, 임신 및 수유기에 이 약을 복용하지 마십시오.
(의사 또는 약사와 반드시 상의하십시오.)

6) 운전 및 기계조작

- 이 약은 정해진 허가사항에 따라 복용한다면, 운전 및 기계조작에 영향을 끼칠 것으로 예상되지 않습니다. 그러나, 이 약을 처음 처방 받으셨다면, 복용 시 운전 및 기계조작에 영향을 끼칠 수도 있음을 유념하도록 합니다.

3. 이 약은 어떻게 복용하도록 합니까?

반드시 의사의 처방에 따라 복용하도록 합니다. 복용법이 불확실한 경우 의사 또는 약사를 통하여 반드시 확인하도록 합니다.

이 약은 만 12세 이상 청소년 및 성인 대상으로 투여합니다. 일반적인 복용법은 1일 1회 1정을 충분한 양의 물과 함께 복용하도록 합니다.

과량으로 복용한 경우

- 과량으로 복용한 경우 의사 또는 약사에게 즉시 알리도록 합니다.

복용 시기를 놓친 경우

- 가능한 빨리 복용하도록 하며, 이후 의사 처방에 따라 복용하도록 합니다. 복용시기를 놓쳤다고 해서 임의로 두 배 용량을 복용하지 않도록 합니다.

4. 이 약의 복용 후 발생 가능한 부작용은 무엇입니까?

모든 의약품과 마찬가지로, 이 약도 부작용을 유발할 수 있습니다. (복용한 모든 사람에게 발생하는 것은 아닙니다.)

흔한 부작용은 (10명 중 최대 1명 꼴) 졸림, 두통, 어지러움, 입 마름, 무력증, 피로감 입니다.
흔하지 않은 부작용은 (100명 중 최대 1명 꼴) 식욕 증가, 신경과민, 집중곤란, 코피, 코 마름, 목 아픔, 기침, 목마름, 비염, 구역, 복통, 소화불량, 구토, 변비, 발적, 요통, 무릎통증, 근육통, 갈증, 전신불편감, 발열, 간 기능 검사치 이상, 체중증가 입니다. 드물게 발생하는 부작용

(1,000명 중 최대 1명 골)은 빠른맥박(빈맥) 및 심장박동수 증가입니다.

부작용이 심해지거나, 설명서에 나와있지 않은 부작용이 발생한 경우 의사 또는 약사에게 알려주시기 바랍니다.

5. 이 약은 어떻게 보관해야 하나요?

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 2) 이 약의 유효기간이 지났을 경우 복용하지 마십시오.
- 3) 빛으로부터 약을 보호하기 위하여 케이스(상자)에 보관하여 주십시오.
- 4) 이 약을 폐기하실 때에는 환경보호를 위하여 하수구 및 생활쓰레기와 함께 버리지 마시고, 약사와 상의하여 폐기하시기 바랍니다.

6. 기타 정보

- 1) 이 약은 양면이 볼록한 원형의 정제입니다.
- 2) 이 약 1정(알) 당 유효성분으로 10mg의 루파타딘(Rupatadine)을 함유하고 있습니다.

제조사: J. Uriach j Compañía, S.A.

(주소 : Av. Cami Reial, 51-57 E-08184 Palau-solita I Plegamans (Barcelona – Spain))

수입자 : 안국약품(주)

(주소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 40)